



ΑΠΟΔΟΣΗ με ΠΟΙΟΤΗΤΑ στο Ακτινίδιο!

Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΛΙΠΑΣΜΑ

Ασβέστιο (CaO) 50%
& Άζωτο (N) 20%
βραδείας αποδέσμευσης



Λίπασμα Ασβεστούχου Κυαναμίδης, εγκεκριμένο στην Ε.Ε.


Σύνθεση: Άζωτο (N) βραδείας αποδέσμευσης - 19,8%
Ασβέστιο (CaO) Αφομοιώσιμο - 50%

Παρέχει στο έδαφος **έγκαιρα** τα **απαραίτητα βασικά και δομικά στοιχεία** για την εξέλιξη της καλλιέργειας εξασφαλίζοντας

- ✓ **Μεγαλύτερες** αποδόσεις
- ✓ **Βελτίωση** ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών
- ✓ **Μετασυλλεκτική** αύξηση της συντηρησιμότητας των καρπών

Η μοναδική του σύνθεση προωθεί την εξυγίανση και αναζωογόνηση του εδάφους, βελτιώνοντας τις φυσικές, χημικές και βιολογικές του ιδιότητες.

Ρυθμός νιτροποίησης της ουρίας και του Αζωτούχου λιπάσματος της Ασβεστούχου Κυαναμίδης **Perlka®**



Η μεγάλη συνεισφορά της Perlka στο Ακτινίδιο (για όλες τις ποικιλίες)

- **Καλύπτει** τις υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο της καλλιέργειας (Φυτό Υψηλής Παραγωγικότητας)
- **Εξασφαλίζει και παρέχει** το Άζωτο (N) αργά και σταθερά (Βραδείας δράσης) υποστηρίζοντας στα μέγιστα τις ανάγκες στα στάδια Βλάστησης, Άνθησης και Καρπώδους.
- **Αποτρέπει** την άμεση παροχή Αζώτου (N) και έτσι την ενίσχυση φαινομένων όπως η κυριαρχία της κορυφής.
- **Μειώνει** τις απώλειες Αζώτου (N) λόγω έκπλυσης, εξασφαλίζοντας τη **μακροπρόθεσμη τροφοδοσία** της καλλιέργειας με άζωτο, ακόμη και με πρώιμη εφαρμογή.
- **Βελτιώνει** την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων λόγω της μείωσης των νιτρικών υπολειμμάτων.
- **Παρέχει έγκαιρα** το Ασβέστιο (Ca) εκκίνησης της καλλιέργειας, εξασφαλίζοντας ένα από τα βασικότερα δομικά στοιχεία.
- **Εφοδιάζει** με ασβέστιο άμεσα διαλυτό, διαθέσιμο και αφομοιώσιμο, βελτιώνοντας την ποιότητα και σκληρότητα των συγκομιζόμενων καρπών, συμβάλλοντας στη μετασυλλεκτική διατήρησή τους.
- **Συμβάλλει** στην γρήγορη αποσύνθεση των πεσμένων φύλλων των ακτινιδίων και στην συνεπαγόμενη μείωση στις μορφές διαχείμασης παθογόνων μυκήτων.
- **Βελτιώνει** τη φυσική του γονιμότητα του εδάφους βοηθώντας στη διάλυση των χουμικών οξέων.
- **Προάγει τη βιοδραστηριότητα** του εδάφους βελτιώνοντας τον αερισμό του στρώματος που δραστηριοποιούνται οι επιφανειακές ρίζες.

2.000 – 12/2022

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το **Φθινόπωρο** : Μετά την πτώση των φύλλων και στο στάδιο του λήθαργου προωθώντας επιπρόσθετα και την **αποσύνθεση των φυτικών υπολειμμάτων**
- Την **Άνοιξη** 20-30 ημέρες (στάδιο λήθαργου της καλλιέργειας) πριν την αναμενόμενη έκπτυξη της βλάστησης

ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 30-40 kg / ΣΤΡ

- **Διασκορπισμό σε ζώνες επί των σειρών φύτευσης: 20 kg / ΣΤΡ**
- **Καθολικά σε όλη την καλλιεργούμενη έκταση: 40 kg / ΣΤΡ**